



# タイで推奨される予防接種スケジュール

(2017年6月現在)

**タイ** (サミティヴェート病院スクムビットで取り扱っているワクチン)

		初回の接種日から数えて								抗体価持続期間 (目安)	その他
		0 日目	1 週間後	3 週間後	4 週間後	8 週間後	3 ヶ月後	6 ヶ月後	12 ヶ月後		
<b>A型肝炎</b>	不活化ワクチン	1							2	1回接種で1年間 2回接種で20年間	
<b>B型肝炎</b>	不活化ワクチン	1			2				3	3回接種後、定期的な 抗体チェックを推奨	
<b>A,B型肝炎混合</b>	不活化ワクチン	1			2				3	3回接種で 15~20年間	
<b>破傷風*1</b>	不活化ワクチン	1			2				3	3回接種で10年間	過去に予防接種 していれば、 1回の追加接種
<b>狂犬病*2</b>	不活化ワクチン	1	2	3						3回接種で2年間	
<b>腸チフス</b>	不活化ワクチン	1								1回接種で3年間	
<b>日本脳炎</b>	弱毒生 ワクチン									1回接種で2年間	
	Imojev	1									
	CD Jevax	1						2		2回接種で3年間	
<b>デング熱</b>	弱毒生ワクチン	1							2	3回接種で6年間 (新しいワクチンのため 持続期間は研究段階)	9歳~45歳が 接種可能

\*1 タイでは三種混合ワクチンをブースターとして単回接種することが多い

\*2 ワクチン接種をしても、狂犬病を否定できない動物に咬まれた場合には、再度ワクチン接種が必要ですので、必ず病院を受診してください

## (参考) 日本で流通しているワクチン

		初回の接種日から数えて								抗体価持続期間 (目安)
		0 日目	1 週間後	3 週間後	4 週間後	8 週間後	3 ヶ月後	6 ヶ月後	12 ヶ月後	
<b>A型肝炎</b>	不活化ワクチン	1		2					3	3回接種で10年間
<b>B型肝炎</b>	不活化ワクチン	1			2				3	
<b>破傷風*1</b>	不活化ワクチン	1			2				3	3回接種で10年間
<b>狂犬病</b>	不活化ワクチン	1			2				3	3回接種で2年間
<b>腸チフス</b>	不活化ワクチン	1								
<b>日本脳炎</b>	不活化ワクチン	1	2						3	3回接種で4年間

\*1 1967年以前生まれの方。1968年以降生まれの方は1回接種

サミティヴェート病院スクムビット 日本人相談窓口

Tel: 020-222-122~124 (毎日7時~20時) Email: japan@samitivej.co.th